

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ АМЛОДИПИНОМ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ИЗО- И ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ТИПАМИ ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

А.Ю. Егорова

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

Изучено значение изо- и гипертензивных типов ортостатических реакций (ОР) артериального давления (АД) в лечении артериальной гипертензии (АГ) антагонистом кальция амлодипином по результатам наблюдения за 98 пациентами с АГ в возрасте ($62,93 \pm 5,79$) года. По изменениям систолического (САД) и диастолического (ДАД) АД при переходе из клиностаза в ортостаз пациентов относили к одной из двух выделенных групп: 1-я — изотензивный тип ОР и 2-я — гипертензивный. У 27 пациентов спустя 4 года от начала лечения оценены степень и частота неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов: инсульты, инфаркты, летальные исходы. Установлено, что снижение САД в клино- и ортостазе было выше у пациентов с АГ с изотензивным типом ОР, тогда как снижение ДАД преобладало у пациентов с гипертензивным типом ОР. Общее число неблагоприятных исходов при изотензивном типе ОР САД — 12 % — преобладало над таковым при гипертензивном типе — 6 %. Общее число неблагоприятных исходов при изотензивном типе ОР ДАД — 12 % — преобладало над показателем при гипертензивном типе — 3 %. В терапии пациентов с АГ амлодипином необходимо контролировать ОР АД, чтобы своевременно диагностировать и предупредить дальнейшее развитие неблагоприятных исходов.

Ключевые слова: систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление, ортостатические реакции, артериальная гипертензия, амлодипин.