

# ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ АМЛОДИПІНОМ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З ІЗО- І ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ ТИПАМИ ОРТОСТАТИЧНИХ РЕАКЦІЙ

А.Ю. Єгорова

Вивчено значення ізо- і гіпертензивних типів ортостатичних реакцій (ОР) артеріального тиску (АТ) в лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) антагоністом кальцію амлодипіном за результатами спостереження за 98 пацієнтами з АГ у віці  $(62,93 \pm 5,79)$  року. По змінах систолічного (САТ) і діастолічного (ДАТ) АТ при переході з кліностазу в ортостаз пацієнтів відносили до однієї з двох виділених груп: 1-ша — ізотензивний тип ОР і 2-га — гіпертензивний. У 27 пацієнтів через 4 роки від початку лікування оцінені ступінь і частота несприятливих серцево-судинних наслідків: інсульти, інфаркти, летальні наслідки. Встановлено, що зниження САТ у кліно- і ортостазі було вище у пацієнтів з АГ з ізотензивним типом ОР, тоді як зниження ДАТ переважало у пацієнтів з гіпертензивним типом ОР. Загальна кількість несприятливих наслідків при ізотензивному типові ОР САТ — 12 % — переважала таку при гіпертензивному типі — 6 %. Загальна кількість несприятливих наслідків при ізотензивному типові ОР ДАД — 12 % — переважала таку при гіпертензивному типі — 3 %. У терапії пацієнтів з АГ амлодипіном необхідно контролювати ОР АТ, щоб своєчасно діагностувати і попередити подальший розвиток несприятливих наслідків.

**Ключові слова:** систолічний артеріальний тиск, діастолічний артеріальний тиск, ортостатичні реакції, артеріальна гіпертензія, амлодипін.