

ОСОБЛИВОСТІ ОРТОСТАТИЧНИХ РЕАКЦІЙ ДІАСТОЛІЧНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ КОМОРБІДНОЇ З ОСТЕОАРТРОЗОМ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА ЕТАПАХ ТЕРАПІЇ

I.В. Солдатенко, М.І. Яблучанський

Показано, що коморбідна з остеоартрозом (ОА) АГ зустрічалася у половини пацієнтів, при цьому в групі АГ+ОА спостерігалися більш високі ступінь і стадія АГ, ніж у групі ізольованої АГ (ІАГ) незалежно від типу ортостатичних реакцій. До терапії при АГ+ОА, як і при ІАГ, переважав гіпертензивний тип ортостатичних реакцій ДАТ, гіпотензивний тип зустрічався в два рази частіше, ніж при ІАГ. Коморбідність АГ з ОА на етапах терапії посилювала міграцію типів ортостатичних реакцій в гіпотензивний тип. При АГ+ОА та ІАГ відбувалося однакове зниження частоти несприятливої кваліфікованої гіпотензивної ОР ДАТ. Використані препарати та схеми терапії в цілому позитивно впливали на перебіг АГ в обох порівнюваних групах, будучи менш ефективними у відношенні ДАТ у пацієнтів з АГ+ОА.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, остеоартроз, ортостатичні реакції, коморбідність, лікування.